



● ***Ramaria formosa*** (Pers.: Fr.) Quél.

**Famiglia:** Ramariaceae

**Sinonimi:** *Clavaria formosa* Pers.

**Etimologia:** *Ramaria* deriva dal lt. *ramus* (cfr. *Ramaria botrytis*), mentre *formosa*, ‘bella, graziosa’, in allusione forse alla vistosità della specie.

**Nomi comuni:** ditola.

**Nomi popolari liguri:** richetta roussa, sponga d'erpetta, gasparina, righetta russa, diete, magnin-e, menete, righette, ditelle. **In AltaVal di Vara:** //.

**Periodo di crescita:** estivo-autunnale.

**Caratteristiche morfologiche:** carpoforo fino a 20 cm. **Ramificazioni** spesse, di colore bianco, arancio-gialle all'apice. **Carne** bianca, bruno-rossa al taglio o alla manipolazione. **Sporata** ialina.

**Habitat:** boschi. In Alta Valle del Vara risulta più abbondante nei boschi di latifoglie.

**Commestibilità:** **tossico!** Produce una sindrome con disturbi a carico dell'apparato gastroenterico.

**Osservazioni:** *R. formosa* è la specie più rappresentante delle ramarie tossiche; la tradizione popolare ritiene tali le ramarie aventi colore giallo.

